




Julio Cesar Razera

GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
CREMERS 37229

GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA

Orientações e Cuidados



Procedimento no qual uma sonda é inserida diretamente na cavidade gástrica (através de endoscopia digestiva) para administração de dieta, água e medicações em pacientes com doenças que impedem/difícultem a alimentação por via oral.

- Aguarde, pelo menos, 4 horas para utilizar a gastrostomia após a inserção;
- Mantenha os cuidados de higiene oral do paciente (mesmo ele não comendo pela boca);
- A presença da gastrostomia não impede que o paciente se alimente pela boca (desde que liberado pelo médico assistente ou fonoaudiólogo);
- Prepare cuidadosamente a dieta e o tempo de infusão conforme orientação nutricional;
- Lave as mãos antes e após a manipulação da sonda;
- Mantenha o local limpo (soro fisiológico ou água morna) e seco (gaze);
- Tente manter a sonda fixa junto à pele (fita microporosa ou cinta elástica para ostomia);
- Lave a sonda antes e após a utilização (seringa com 20ml de água filtrada ou mineral);
- Administre a dieta sempre com a cabeceira elevada ou com o paciente sentado;
- Após a infusão da dieta, manter o paciente na posição acima por pelo menos 1 hora;
- Dilua adequadamente as medicações para administração via sonda (evitar obstrução);
- Não tracione a sonda e atente para sinais de infecção (vermelhidão, secreção, etc);
- Se houver vômitos, secreção, sangramento, obstrução ou vazamento da dieta, agende uma consulta com brevidade para revisão da sonda;
- Se houver remoção acidental, procure a emergência com brevidade ou entre em contato com seu médico para passagem de nova sonda pelo orifício;
- A vida útil da sonda é variável. Revise periodicamente (pelo menos a cada 6 meses) para avaliar a necessidade de eventual troca.